

## Grile Endodontie

### Complement simplu

1. Pulpita acuta seroasa partiala se caracterizeaza prin:
  - a. Durere vie
  - b. Durere spontana
  - c. Durere iradiata
  - d. Durerea nu cedeaza la antialgice
  - e. Teste de vitalitate negative

Rasp correct: a

2. Pulpita acuta seroasa totala se caracterizeaza prin urmatoarele, cu exceptia:
  - a. Durere violenta
  - b. Durere continua
  - c. Durere care cedeaza la antialgice
  - d. Durerea iradiaza la dintii vecini si antagonisti
  - e. Durere spontana

Rasp correct: c

3. Diagnosticul pozitiv in pulpita acuta purulenta se stabileste pe baza urmatoarelor semne:
  - a. Exacerbarea durerii la rece
  - b. Calmarea durerii la cald
  - c. Durere lancinanta insuportabila
  - d. Calmarea durerii la rece
  - e. Senzatia de egresiune a dintelui

Rasp correct: d

4. Diagnosticul pozitiv in pulpita cronica deschisa ulcerosa se stabileste pe baza urmatoarelor semne, cu exceptia:
  - a. Absenta durerii
  - b. Carie profunda cu deschiderea camerei pulpare
  - c. Sangerare la inteparea pulpei cu sonda
  - d. Teste de vitalitate negative chiar si la intensitati mari
  - e. Percutia in ax negative

Rasp correct: d

5. Semnele obiective in parodontita apicala acuta seroasa sunt urmatoarele:
  - a. Durere violenta, insuportabila
  - b. Durerea nu cedeaza la calmantele uzuale
  - c. Congestia mucoasei in dreptul radacinii

- d. Durerea este exacerbata de cresterea fluxului sangvin in extremitatea cefalica
- e. Testele de vitalitate sunt intens positive

Rasp correct: c

- 6. Despre parodontita apicala acuta purulenta sunt adevarate urmatoarele afirmatii, cu exceptia:
  - a. Tegumente calde, destinse, dureroase la palpare.
  - b. Tumefactie localizata sau difuza
  - c. Durere intense la percutie si presiune axiala
  - d. Durerea in stadiul endoosos este iradiata
  - e. Durerea in stadiul endoosos este localizata

Rasp correct: e

- 7. Parodontita apicala cronica acutizata se caracterizeaza prin:
  - a. Percutia in ax negative
  - b. Teste de vitalitate pozitive la intensitati mari
  - c. Mobilitatea dintelui
  - d. Imagine radiologica neconcludenta
  - e. Absenta tumefactiei

Rasp correct: c

- 8. Urmatoarele afirmatii despre infectiile endodontice sunt adevarate, cu exceptia:
  - a. Infectia primara este cauzata de microorganism care invadeaza spatiul endodontic pentru prima oara
  - b. Infectia secundara este cauzata de microorganisme care au patruns in spatiul endodontic in timpul tratamentului prin contaminarea sistemului endodontic
  - c. Infectia secundara este cauzata de microorganisme care au patruns in spatiul endodontic intre doua sedinte de tratament
  - d. Infectia primara este cauzata de microorganisme care au patruns in spatiul endodontic intre doua sedinte de tratament
  - e. Infectia secundara este cauzata de microorganisme care au patruns in spatiul endodontic la finalul tratamentului

Rasp correct: d

- 9. Obiectivele biologice ale prepararii canalului radicular sunt urmatoarele:
  - a. Canalul radicular preparat trebuie sa aiba o forma conica continua, de la apex catre coronar
  - b. Trebuie mentinut traseul anatomic original al canalului radicular mai ales in treimea apicala
  - c. Trebuie mentinuta pozitia si forma originala a foramenului apical
  - d. Instrumentarea canalului radicular trebuie facuta respectand tesuturile periapicale, fara extindere in afara canalului radicular
  - e. Diametrul foramenului apical trebuie mentinut cat mai redus

Rasp correct: d

10. Despre preezare sunt adevarate urmatoarele afirmatii, cu exceptia:

- a. Se realizeaza cu freze Gates Glidden
- b. Se actioneaza cu preponderenta pe peretii opusi furcatiei
- c. Este o largire excentrica a treimii coronare radiculare
- d. Este o largire concentrica a treimii coronare radiculare
- e. Scopul acestei miscari este de a reduce curbura treimii coronare a canalului radicular

Rasp correct: d

Complement multiplu:

11. Despre calea de alunecare (glide path) sunt adevarate urmatoarele afirmatii:

- a. Se poate realiza manual cu ace tip Kerr de la 006 ISO pana la 015-020 ISO
- b. Se poate realiza rotativ cu instrumente in rotatie continua sau reciprocitate
- c. Se poate realiza cu ajutorul frezelor Gates Glidden
- d. Permite utilizarea in siguranta a instrumentelor rotative din Ni-Ti
- e. Reduce riscul de fractura in canal a instrumentelor din Ni-Ti

Rasp correct: a,b,d,e

12. Sistemul ProTaper Next este compus din urmatoarele instrumente rotative:

- a. Instrumentul X1 cu inel galben, diametru la varf 0,17mm si conicitate 4%
- b. Instrumentul X2 cu inel rosu, diametrul la varf 0,20 si conicitate 6%
- c. Instrumentul X2 cu inel rosu, diametrul la varf 0,25 si conicitate 6%
- d. Instrumentul X3 cu inel albastru, diametrul la varf 0,30 si conicitate 7%
- e. Instrumentul X3 cu inel albastru, diametrul la varf 0,30 si conicitate 6%

Rasp correct: a, c, d

13. Despre pansamentul medicamentos cu hidroxid de calciu sunt adevarate urmatoarele:

- a. Are actiune de neutralizare a endotoxinelor in dentina
- b. Se aplica in canalele radiculare cu prezenta exudatului
- c. Are actiune antibacteriana
- d. Nu poate contribui la vindecarea leziunilor periapicale
- e. Efectul optim de dezinfectant in canalul radicular se obtine in decurs de 3-4 zile

Rasp correct: a,b,c

14. Indicatiile pansamentului endodontic cu hidroxid de calciu sunt urmatoarele:

- a. Apexificare
- b. Resorbție radiculară externă

- c. Resorbție radiculară internă
- d. Replantare după avulsie traumatică
- e. Leziuni periapicale importante

Rasp correct: a,b, d, e

15. Indicațiile obturării de canal în aceeași sedință cu tratamentul chemo-mecanic sunt următoarele:
- a. Dinte vital lipsit de patologie pulpară
  - b. Dinte vital cu patologie pulpară
  - c. Dinte devital simptomatic
  - d. Dinte devital asimptomatic
  - e. Canale radiculare cu persistența secreției

Rasp correct: a,b, d

16. Calitățile materialului ideal de obturație de canal sunt următoarele:
- a. Capacitate de sigilare apicală și laterală
  - b. Aderent la peretii canalului radicular
  - c. Radioopacitate
  - d. Radiotransparență
  - e. Antimicrobian

Rasp correct: a,b,c,e

17. Tehnica de condensare laterală la rece presupune îndeplinirea următoarelor condiții:
- a. Proba conului master se face în canalul radicular perfect uscat
  - b. Proba conului master se face în canalul radicular umed, irigat în prealabil cu hipoclorit de sodiu
  - c. Conul master ajuns la lungimea de lucru trebuie să prezinte tug-back
  - d. Proba spreaderului se face după introducerea sealerului și a conului master
  - e. Proba pluggerului se face după introducerea sealerului și a conului master

Rasp correct: b, c,

18. Elementele favorizante ale incidentelor și accidentelor în cursul tratamentului endodontic sunt următoarele:
- a. Poziția dintelui pe arcadă, cu dificultăți de vizibilitate și acces
  - b. Erori de diagnostic
  - c. Gradul de distrucție coronară
  - d. Tehnica și instrumentar neadecvate situației clinice
  - e. Complexitatea sistemului endodontic

Rasp corecte: a, c, e

19. Elementele determinante ale incidentelor și accidentelor survenite în cursul tratamentului endodontic sunt următoarele:

- a. Tehnica si instrumentar neadecvate situatiei clinice
- b. Erori de diagnostic
- c. Neglijarea restaurarii coronare adaptate la necesitatile unui dinte devital
- d. Gradul de distructie coronara
- e. Pozitia dintelui pe arcada

Rasp corecte: a,b,c

20. Crearea pragului pe parcursul tratamentului endodontic este favorizata de:

- a. Cavitate de acces incorect realizata
- b. Canale radiculare drepte
- c. Canale radiculare curbe in treimea apicala
- d. Instrumentar endodontic rigid
- e. Instrumentar endodontic de dimensiuni prea mari

Rasp corecte: a,c,d,e

21. Succesul tratamentului endodontic presupune indeplinirea urmatoarelor criterii la controlul efectuat la minim 12 luni de la tratament:

- a. Dinte functional
- b. Absenta durerii, edemului
- c. Poate fi prezenta fistula atat timp cat dintele este asymptomatic
- d. Aspect radiologic lipsit de elemente patologice
- e. Semne radiologice de resorbtie radiculara

Rasp corecte: a, b, d

22. Cauzele esecului tratamentului endodontic pot fi urmatoarele:

- a. Infiltratii marginale de-a lungul obturatiei de canal prin pierderea integritatii restaurarii coronare
- b. Infiltratii marginale de-a lungul obturatiei de canal prin adaptarea marginala corecta a restaurarii coronare
- c. Recidiva de carie
- d. Caria secundara
- e. Fractura radiculara

Rasp corecte: a,c,d,e

23. Esecul tratamentului endodontic poate fi determinat de urmatoarele situatii:

- a. Patologie parodontala marginala cronica netratata ce duca la infiltratie microbiana prin foramenul apical
- b. Patologie parodontala marginala cronica netratata ce duca la infiltratie microbiana prin canalele laterale neobturate
- c. Obturatie coronara corect adaptata marginal si modelata morfo-functional
- d. Carie secundara

e. Recidiva de carie

Rasp corecte: a,b,d,e

24. La testele de vitalitate electrice un raspuns fals pozitiv poate sa apara in urmatoarele situatii:

- a. Dintele nu este corect izolat
- b. Dintele este complet uscat
- c. Electrocul are contact cu tesutul gingival
- d. Electrocul are contact cu o restaurare metalica
- e. Necroza de lichefactie

Rasp corecte: a, c,d,e

25. Radiografia retroalveolara este deosebit de importanta in diagnosticul urmatoarelor afectiuni:

- a. Pulpita acuta seroasa totala
- b. Pulpita acuta purulenta totala
- c. Parodontita apicala cronica fibroasa
- d. Chist periradicular
- e. Parodontita apicala condensanta

Rasp corect: c,d,e

26. Formele de pulpite ireversibile sunt urmatoarele:

- a. Pulpita acuta seroasa totala
- b. Pulpita acuta seroasa purulenta
- c. Pulpita acuta seroasa partial in stadiul de debut
- d. Pulpita acuta seroasa partial in stadiul evolutiv
- e. Pulpitele cronice

Rasp corecte: a,b,d,e

27. Hiperemia preinflamatorie se caracterizeaza prin urmatoarele:

- a. Durere provocata de rece
- b. Durere provocata de cald
- c. Durere spontana de intensitate moderata
- d. Durere localizata
- e. Durerea cedeaza la cateva minute dupa indepartarea stimulului

Rasp corecte: a,d,e

28. Pulpita acuta seroasa partial reversibila se caracterizeaza prin:

- a. Durere provocata la rece
- b. Durere localizata
- c. Durere spontana
- d. Durerea cedeaza la antialgice

e. Durerea cedeaza la cateva ore dupa indepartarea stimulului

Rasp corecte: a, b

29. Pulpita acuta seroasa totala se caracterizeaza prin urmatoarele:

- a. Acumulare de exudat seros care produce cresterea presiunii intratisulare
- b. Compresiune vasculara
- c. Scaderea circulatiei venoase
- d. Demielinizarea fibrelor nervoase
- e. Formarea de microabcese la nivelul intregului tesut pulpar

Rasp corecte: a,b,c,d

30. Pulpita cronica deschisa ulceroasa se caracterizeaza prin :

- a. Jena la masticatie
- b. Durere spontana
- c. Durere provocata de rece si cald
- d. Carie profunda cu deschiderea camerei pulpare
- e. Teste de vitalitate negative

Rasp corecte: a, d